

AQUILEGIA VULGARIS L. (Ranunculáceas)

Castellano: Aguiluña, pajarilla, clérigos.

En Alava: Farolillos de San Antonio.

Se tuvo como diurética, sudorífica y aperitiva, en tiempos antiguos, perdiendo luego prestigio e incluso es considerada por algunos autores como venenosa. Los pastores creen que es ponzoñosa para el ganado.

El tallo, ramificado en la parte superior, erecto, generalmente peloso, puede alcanzar hasta un metro de altura. Las hojas inferiores, muy pecioladas, compuestas, con foliolos verdes en el anverso, presentan una tonalidad más clara por el reverso que es tomentoso.

Las flores de azul intenso a violeta, grandes, penduladas, sostenidas por un largo cabillo, forman ramilletes poco poblados. Están formadas por cinco sépalos de la misma textura y color que los pétalos; estos últimos, también en número de cinco, se prolongan en la base en forma de espolón ganchudo. Estambres, poco salientes, amarillos.

Florece de fines de Abril a Julio.

ANTIRRHINUM MAJUS L. (Escrofulariáceas)

Euskara: Kukupraka.

Castellano: Boca de dragón, boca de león, conejitos, etc.

Es considerada vulneraria, aplicándose en la curación de tumores y heridas.

De apariencia muy variable, habiendo encontrado un grupo en el que apenas sobresalían los tallos de la masa verde formada por las hojas, con una altura máxima de 20 cm. y un máximo de 4 flores por vástago, y a 10 m. de distancia, otro con esbeltos tallos, erectos y abundantes flores.

De tallos erectos, pubescentes, endurecidos en la base, hojas lanceoladas, opuestas las inferiores, ligeramente pecioladas.

Flores rosas o púrpuras, los lóbulos del labio superior amarillo; de una sola pieza, tubular, dividida en dos labios, más corto el superior. Cáliz verde, unido al vástago por un corto rabillo. Si oprimimos lateralmente la corola, se abre, representando una boca y de ahí los nombres populares que recibe.

Recogida en las cercanías de la Boca del Infierno, a 1.000 m. de altura.

HYPERICUM BURSERI (Hypericáceas)

Se trata de una subespecie pirenaica del *Hypericum richeri*, que crece en los Alpes Centrales, Jura y Apeninos, y de la que se diferencia por tener las hojas con base abrazadora y las flores mayores. Llega a tener una altura de 40 cm.; tallos erectos, agrupadas. Hojas opuestas, soldadas alrededor del tallo. Flores, en número variable, en el extremo del vástago, amarillas, con los pétalos salpicados de pun-



Aquilegia vulgaris L. (Ranunculáceas).

FLORES DEL VALLE DE HECHO

Gerardo Lz. de Guereñu

titos negros. Estambres, del mismo color que los pétalos, abundantes.

Recogida en el barranco de Acherito, a mediados de Julio, a 1.350 m. de altura.

LILIUM PYRENAICUM (Liliáceas)

Especie de azucena silvestre que habita en lugares muy localizados del Pirineo. Tiene tres hermanas, el *L. martagón* que, aparte del Pirineo, crece en los Alpes y Apeninos, y los *L. carnolicum* y *L. pomponium*, que solamente se encuentran en los Alpes.

Es una planta robusta que alcanza una altura por encima del medio metro, con abundantes hojas alternas, estrechas, lanceoladas, muy juntas, de un verde claro.

La inflorescencia se encuentra en el extremo del vástago, siendo variado el número de flores, formadas por seis tépalos oblongos que se curvan hacia atrás en forma de corona real, unidas al tallo por un largo cabillo, siendo pendulares. Presentan un color amarillo intenso, con una pequeña franja verde claro en el centro de cada tépalo que está salpicado de pequeñas, aunque abundantes, rayitas pardas. Las antenas, sobresalientes, naranja fuerte.

Est planta, tan hermosa a la vista, es sumamente desagradable al olfato, por su fuerte y fétido olor.

SAXIFRAGA LONGIFOLIA Lapeyrouse

(Saxifragáceas)

Castellano: Corona del rey.

Se trata de una gran roseta que puede medir hasta 30 cm. de diámetro y que aprovecha las pequeñas grietas de las rocas calizas para desarrollarse, lo que hace durante varios años hasta que florece, marchitándose a continuación.

Las hojas que forman la roseta tienen entre 6 v 12 cm. de largo, acintadas, carno-

sas, de unos 6 mm. de ancho, ensanchándose en la punta, en forma de lanza y algo curvada hacia el interior. En sus bordes tienen una serie de poros por donde rezuman un líquido que al evaporarse deja unas incrustaciones calizas. El color verde grisáceo.

El tallo, robusto, alcanza hasta 80 cm. de largo, sobresaliendo de la roca, doblándose, por el peso de las flores, en el extremo. Las flores, numerosas, blancas, se disponen en amplias panículas.

Las podemos contemplar a lo largo del desfiladero, desde la Boca del Infierno hasta Oza, en donde encontramos muchas rosetas, más o menos desarrolladas y, de vez en cuando, alguna florecida.

PHYTEUMA ORBICULARE L.

(Campanuláceas)

De altura variable, puede alcanzar los 50 cm. Tallo sin ramificar, erecto, con una sola flor en su extremo. Hojas inferiores festoneadas y pecioladas, las superiores, más estrechas, no pecioladas. La flor, azul violeta, es una cabezuela globulariácea.

Encontrada, a mediados de Julio, en el término de las Ferrerías, a 1.400 m. de altura.

VOCABULARIO

Con el fin de facilitar la interpretación de los textos a los lectores no familiarizados con los términos botánicos, añadimos en este primer trabajo, un vocabulario de las palabras usadas.

ALTERNAS. Hojas distribuidas a lo largo del tallo, de manera que cada una ocupa en su lado la parte correspondiente a la que queda libre en el opuesto.

ANTENA. Parte del estambre que contiene el polen.

CABILLO. Pezón o rabillo que sostiene la hoja, la flor o el fruto.

CALIZ. Cubierta externa de las flores, formado por los sépalos.

COROLA. Conjunto de pétalos que forman una flor.

ESTAMBRES. Órgano sexual masculino de las plantas. Consta del filamento y antena.

FOLIOLOS. Cada una de las hojuelas de una hoja compuesta.

OPUESTAS. Hojas que nacen al mismo nivel una enfrente de la otra.

PANÍCULA. Conjunto de racimos colocados en forma piramidal.

PECIOLO. Pezón o rabillo de la hoja.

PETALOS. Cada una de las hojas que forman la corola de la flor.

PUBESCENTE. Velloso.

SEPALOS. Cada una de las divisiones del cáliz.

TEPALO. Aplicado a los pétalos y sépalos cuando ambos son iguales.

TOMENTOSO. Vello suave y entrelazado.



Antirrhinum majus L. (Escrofulariáceas).



Hypericum burseri (Hypericáceas)



Lilium pyrenaicum (Liliáceas).



Saxifraga longifolia Lapeyrouse (saxifragáceas).



Phyteuma orbiculare L. (Campanuláceas).